


# Schwangerschaftsverhütung nach Anästhesie

## INFORMATION FÜR PATIENTINNEN



**Abteilung für Anästhesiologie und Reanimation**  
Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis

**Sie haben ein Medikament erhalten, welches die  
Verhütung beeinflussen kann. Bitte lesen Sie die  
Rückseite aufmerksam durch.**



Hôpital du Valais  
Spital Wallis

[www.hopitalvs.ch](http://www.hopitalvs.ch) | [www.spitalvs.ch](http://www.spitalvs.ch)

Die Wirkung einer hormonellen Schwangerschafts-Verhütung wird durch Sugammadex (Bridion®) eingeschränkt.

Das Risiko einer Schwangerschaft ist erhöht. Je nach Art der hormonellen Schwangerschafts-Verhütung ist Folgendes zu beachten:

### FALLS SIE EINE ORALE SCHWANGERSCHAFTSVERHÜTUNG («DIE PILLE») EINNEHMEN

- Reine Progesteron Präparate («mini-Pille», «Gestagen-Pille»)
- Kombinierte Progesteron/Östrogen Präparate («Pille»)

Auch wenn Sie heute Morgen Ihre Pille genommen haben, führt die Gabe von Sugammadex dazu, dass die Wirkung der Pille unsicher ist. Dies entspricht dem Risiko einer «vergessenen Pille». Bitte beachten Sie den Hinweis einer vergessenen Einnahme auf der Packungsbeilage Ihrer Verhütungs-Pille.

### FALLS SIE EINE ANDERE HORMONALE SCHWANGERSCHAFTSVERHÜTUNG BENUTZEN

- Dreimonatsspritze
- Verhütungspflaster
- Hormonstäbchen
- Vaginalring
- Hormonspirale

Für die nächsten 7 Tage müssen Sie eine Barrieremethode, wie z.B. Kondome zur Verhütung verwenden. Bei allfälligen Fragen steht Ihnen das ärztliche Behandlungsteam gerne zur Verfügung.

### ZUSAMMENFASSUNG

- Sie haben heute Sugammadex erhalten
- Sugammadex kann die Verhütung beeinflussen
- Falls Sie die «Pille» (kombiniert oder «mini-Pille») nehmen, müssen Sie der Empfehlung der Packungsbeilage für «vergessene Einnahme» folgen (auch wenn Sie die Pille heute genommen haben).
- Falls Sie Verhütungspflaster, Stäbchen, Dreimonatsspritze, Vaginalring oder Hormonspirale verwenden, müssen Sie die nächsten 7 Tage zusätzlich mit einer Barrieremethode (Kondome) verhüten

Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis  
**Abteilung für Anästhesiologie und Reanimation**  
Kontakt : +41 (0) 603 42 37